

HIPERADRENOCORTICISMO HIPÓFISE-DEPENDENTE EM CÃO: RELATO DE CASO

BUENO, Maria Eduarda Cambuy; **CAMPOS**, Aline Gomes; **MORENO**, Mariana Estorino; **SALOMÃO**, Ricardo Lima

O hiperadrenocorticismismo (HAC) canino ou Síndrome de Cushing é uma endocrinopatia, representado pela administração ou produção de glicocorticoides. Uma das suas classificações espontânea é o hiperadrenocorticismismo hipófise-dependente, que é caracterizado pela secreção inapropriada de ACTH. Os cães com HAC têm idade média 11 anos, sendo que a grande maioria são relatados em fêmeas, tendo maior prevalência em animais das raças Boxer, Boston Terrier, Dachshund, Poodle e Scottish Terrier. Alguns sinais clínicos são polifagia, poliúria, polidipsia, abdomên abaulado, pele fina e inelástica, letargia, alopecia, calcinose cutânea, sinais neurológicos e hipertensão. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso clínico de uma cadela, Poodle, com 12 anos, atendida no Hospital Veterinário Carlos Fernando Rossato da Faculdade Dr. Francisco Maeda (FAFRAM), diagnosticada e tratada para hiperadrenocorticismismo hipófise-dependente.