

## **O USO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE BARBATIMÃO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA POR SEGUNDA INTENÇÃO EM EQUINO**

**BORGES**, Larissa Cristina<sup>1</sup>; **PEREZ**, João Paulo B. C.<sup>1</sup>; **D'AURIA**<sup>2</sup> Eliana; **DE PAULA**, Cleber J. S<sup>3</sup>.

Um equino adulto da raça quarto de milha sofreu um acidente com cerca de arame farpado e foi encontrado dias depois com uma ferida na face, ao lado do olho, com exposição óssea e presença de miíase. A ferida foi tratada topicamente com um fitoterápico, sendo este a solução aquosa de barbatimão. Foram observados os aspectos macroscópicos e morfométricos da ferida, tratada por segunda intenção. Houve tratamento diário da lesão até total cicatrização. O barbatimão beneficiou a cicatrização que ocorreu completamente em seis semanas de tratamento.

---

<sup>1</sup> Graduando em Medicina Veterinária, Fafram, Ituverava, SP

<sup>2</sup> Mestre em nutrição de eqüinos, FMVZ/USP, Pirassununga, SP

<sup>3</sup> Dr. em microbiologia agropecuária, UNESP, Jaboticabal, SP

---