

LOBECTOMIA DECORRENTE DE HEMOPERITÔNIO POR LACERAÇÃO HEPÁTICA TRAUMÁTICA: RELATO DE CASO

PRUDÊNCIO, Bruna Maria Calife Corrêa¹; **HERKER**, Carolina Pires²; **HENRIQUE**, Marina Barrachi³; **SALOMÃO**, Ricardo Lima⁴; **LEGA**, Elzylene⁵

Dentre os acidentes urbanos que ocorrem com os animais domésticos, destacam-se os acidentes automobilísticos devido a sua grande ocorrência e a gravidade dos traumas que eles acarretam. O trauma abdominal é a causa da maioria dos óbitos por hipovolemia em animais atropelados devido a lesões e rupturas de órgãos que resultam em graves hemorragias e hemoperitônio. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de um cão sem raça definida, de 3 anos de idade com histórico de atropelamento que apresentava aumento de volume abdominal. Por meio do exame físico, palpação e exame ultrassonográfico foi possível constatar a presença de líquido livre intra-abdominal. Foi realizada abdominocentese pela qual se confirmou a suspeita de hemoperitônio e o animal foi encaminhado para laparotomia exploratória emergencial, na qual observou-se a laceração em lobo medial esquerdo do fígado e foi executada a técnica de lobectomia, que possibilitou a completa hemostasia e recuperação do animal.

¹ Médica Veterinária Pós-graduanda em Clínica Médica, Cirúrgica e Anestesiologia de Pequenos animais, Faculdade Doutor Francisco Maeda, Ituverava, São Paulo.

² Médica Veterinária Pós-graduanda em Clínica Médica, Cirúrgica e Anestesiologia de Pequenos animais, Faculdade Doutor Francisco Maeda, Ituverava, São Paulo.

³ Médica Veterinária Pós-graduada em Clínica Médica, Cirúrgica e Anestesiologia de Pequenos animais, Faculdade Doutor Francisco Maeda, Ituverava, São Paulo.

⁴ Médico Veterinário Mestre em Ciência Animal, Universidade de Franca, Franca, São Paulo.

⁵ Professora Doutora em Cirurgia Veterinária, FCAV/UNESP, Jaboticabal, São Paulo.
