

TORÇÃO ENTRE COLÓN MENOR E COLÓN TRANSVERSO EM EQUINO: RELATO DE CASO

LEÃO, Douglas¹; **CARON**, Maria Eduarda²; **MANZAN**, Isabela Beatriz³; **SILVA**,
Guilherme L. Gomes⁴; **D' AURIA**, Eliana⁵.

A síndrome cólica trata-se de um dos principais casos na rotina da clínica equina. O desconforto abdominal relacionado à enfermidade, de maneira geral, se deve ao aumento da pressão na luz intestinal, alteração no posicionamento anatômico das alças intestinais, inflamações ou espasmos musculares. Foi atendido no hospital veterinário da Faculdade Dr. Francisco Maeda um equino, fêmea, sem raça definida, 350 kg, 18 anos, prenhe, apresentando abdominalgia. O paciente durante avaliação clínica apresentava frequência cardíaca e respiratória elevadas e ausência de sons intestinais. Durante procedimento cirúrgico, diagnosticou-se a presença de torção entre cólon transverso e cólon menor, com alto grau de comprometimento das alças. Havia necrose da camada serosa e mucosa, porém não apresentava pontos de ruptura. Após o diagnóstico optou-se pela realização de eutanásia do paciente.

¹ Aprimorandos em Medicina Veterinária FAFRAM/FE, Ituverava, SP.

² Aprimorandos em Medicina Veterinária FAFRAM/FE, Ituverava, SP.

³ Aprimorandos em Medicina Veterinária FAFRAM/FE, Ituverava, SP.

⁴ Aprimorandos em Medicina Veterinária FAFRAM/FE, Ituverava, SP.

⁵ Prof^a Mestre da FAFRAM/FE, Ituverava, SP.
